

دفتريا

په لاندې برخه کې د دفتريا په هکله معلومات چمتو شوي دي ترڅو په استفادې سره يې وکولى شي خپل ځان او نور وژغوري. دفتريا يو ډول ساري ناروغي ده چې کېدای شي وژونکې اوسي. د پناه غوښتنې په مرکز کې کېدای شي له داسې کس سره مخ شئ چې دفتريا ولري. او يا کېدای شي په خپل سفر کې پرته له دې چې پوه شئ، په دفتريا باندې له اخته کس سره تماس ونيسي.

دفتريا څه شی ده؟

دفتريا يو ډول ساري ناروغي ده چې په احتمالي ډول ژوند ته هم خطر پېښولی شي. دا ناروغي د دفتريا له باکټريا څخه رامنځته کېږي چې په جلد يا د پوزې په مخاطو او يا د ستوني په غشاو باندې اغېزه کوي. دا باکټريا يو ډول مضر زهر توليدوي چې همدا زهر د ناروغي سبب ګرځي او په ټول بدن کې خپرېږي او کولی شي د بدن غړيو ته زيان ورسوي. که چېرې کوم کس د دفتريا واکسين نه وي کړي او يا يې د دفتريا درملنه نه وي ترسره کړې، نو په شديد ناروغي يې د اخته کېدو خطر ډېر لوړ دی.

د دفتريا علايم څه دي؟

- د دې ناروغي علايم معمولاً د ناروغ کس سره له تماس وروسته له 2 تر 5 ورځو پورې ښکاره کېږي (خو حد اکثر تر 10 ورځو پورې ممکن ښکاره شي). دا علايم د اغېزمن ځای په موقعيت پورې توپير کوي.
- لومړي علايم يې معمولاً د ستوني درد، کم اشتهايي او ملايمه تبه وي.
- په پوزه، ستوني او/يا هوايي جهاز کې يوه غشا يا پوښ پيدا کېږي چې د خوړو تېرول يا نفس اخيستل ستونزمنوي.
- ممکن په لمفوي غدواتو او د ستوني د دواړو طرفو په انساجو کې پړسوب ښکاره شي. که چېرې دا ناروغي ډېره شديده شي، نو هوايي جهازونه په بشپړ ډول بندېږي.
- او د فرد د خفه کېدو سبب ګرځي.
- که چېرې د دفتريا باکټريا د جلد خلاصو سوريو ته ورسېږي، نو د زخم سبب ګرځي. دا مورد معمولاً په لنډو کې ليدل کېږي.
- د دفتريا د باکټريا له خوا توليد شوي زهر د بدن اعضاوو ته زيان رسوي، مثلاً کولی شي د اعصابو د فلجولو له لارې دا کار ترسره کړي. دا زيانونه د تل لپاره پاتې کېږي.

دفتريا څنګه خپرېږي؟

دفتريا له ملوثو خلکو سره د اړيکې نيولو له لارې خپرېږي، په ځانګړي ډول د پرنجې، ټوخي او خبرو کولو په وخت کې د پوزې يا خولې د قطراتو له لارې خپرېږي. همدارنګه کېدای شي د په دفتريا باندې د اخته کس د پوزې يا خولې د مایعاتو سره د مستقيم تماس له لارې خپره شي، د بېګلې په ډول د مچي کولو له لارې او يا د خوړو د لوبښو د شريکولو له امله. همدارنګه، کېدای شي د ناروغ کس له زخمونو يا د هغوی له جلد سره د تماس له لارې هم دفتريا خپره شي. هغه کسان هم کولی شي د دفتريا باکټريا خپره کړي چې علايم نه دي پکې څرګند شوي.

څنګه کولی شم د دفتريا پر وړاندې د خپل ځان ساتنه وکړم؟

يو ډول واکسين موجود دي چې د دفتريا ناروغي پر وړاندې مؤثر معافيت چمتو کوي (نورې برخې وګورئ).

آيا تاسو (او يا مو ماشوم) د دفتريا د واکسينو 3 دوزه ترلاسه کړي دي، که چېرې هو، نوڅه وخت؟ که چېرې يې په ځواب نه پوهېږئ او يا ډاډه نه ياست، نو بايد همدا اوس واکسين ترلاسه کړئ. د مشورې لپاره لطفاً له روغتيايي متخصص سره اړيکه ونيسئ.

که چېرې مو په ځان کې علايم وليدل، نو بايد فوراً د خپل مرکز کارکوونکو يا د خپل استوګنځي کوربه ته په دې هکله خبر ورکړئ، ترڅو وکولى شئ په وخت سره درملنه ترلاسه کړئ.

مهم ټکی: آيا تاسو (او يا مو ماشوم) د ناروغي احساس لرئ؟ آيا درملو، واکسينو او يا روغتيايي مشاورو ته اړتيا لرئ؟ له روغتيايي متخصص سره د اړيکې نيولو لپاره کولی شئ په آزادانه ډول د مرکز له کارکوونکو يا د خپل استوګنځي له کوربه سره خبرې وکړئ.

که چېرې شکمن شم چې دفتريا لرم، نو بايد څه وکړم؟

که چېرې تاسو (او يا مو ماشوم) د دفتريا علايم لرئ (پورتنۍ برخه وګورئ)، نو لطفاً فوراً د مرکز له کارکوونکو او يا د خپل استوګنځي له کوربه سره خبرې وکړئ. ماسک واچوئ او له کورنۍ څخه د باندې افرادو سره اړيکه مه نيسئ ترڅو نور خلک په ناروغي اخته نه شي.

تاسو بايد ژر تر ژره معاینه ترسره کړئ او درملنه ترلاسه کړئ.

که چېرې له داسې کس سره مخ شم چې دفتريا لري، نو څه بايد وکړم؟

که چېرې تاسو (او يا مو ماشوم) له داسې کس سره مخامخ شئ چې دفتريا لري، نو کارکوونکي به تاسو ته د هغه په هکله خبر درکړي. د دې لپاره چې ډاډه شئ چې تاسو

(او يا مو ماشوم) نه ياست ناروغ، او له ناروغي څخه د نورو خلکو د ساتلو لپاره به دا کارونه ترسره شي:

- تاسو به د انتي بيوتيکو له لارې معالجه شئ،
- تاسو بايد د دفتريا د علايمو له ښکاره کېدو سره سم کارکوونکو خبر ورکړئ او ماسک واچوئ، او
- دامکان ترحدې بايد له نورو سره تماس و نه نيسئ.



د دفتریا پر وړاندې د واکسینو په هکله معلومات

ټول وگړي باید د دفتریا واکسین ترلاسه کړي.

که چېرې تر اوسه د دفتریا پر وړاندې نه یاست واکسین شوي او یا داده نه یاست چې د دفتریا واکسین مو ترلاسه کړي دي او که نه، نو له یوه روغتیايي متخصص سره خبرې وکړئ. دا واکسین د ټیتانوس او پولیو واکسینو سره په مشابه وخت کې تطبیقېږي (په یوه پیچکارۍ کې گډېږي او بیا تزریق کېږي).

د اساسي معافیت ترلاسه کول

که چېرې کوم څوک نه وي واکسین شوي او یا د خپلو واکسینو په هکله داده نه وي، نو د بشپړ معافیت ترلاسه کولو لپاره درې دوز واکسین ضرور دي. دویم دوز له لومړي دوز څخه دوه میاشتې وروسته ورکول کېږي، او دریم دوز له دوهم دوز څخه شپږ میاشتې وروسته تطبیقېږي. که چېرې د واکسینو بل دوز ته اړتیا لرئ خو د ملاقات وخت مو نه وي نیولی نو لطفاً د مرکز له کارکوونکو او یا کوربه سره فعالې خبرې وکړئ.

د تقویتی واکسینو تطبیق

د واکسینو د تاثیر د لوړولو او تمدیدولو لپاره نظر سن ته په هرو 10-20 کالونو کې یوه توقیتي واکسین ته اړتیا ده، او که چېرې له ملوټ کس سره تماس ولرئ نو کېدی شي دا موده نوره هم راکمه شي.

د واکسینو احتمالي جانبي عوارض

هر واکسین ممکن جانبي عوارض ولري. دا خفیف جانبي عوارض د واکسینو له تطبیق وروسته ډېر معمول دي:

- د پیچکارۍ په ساحه کې درد، سوروالی او پړسوب (ستاسو په ځنګل کې د پیچکارۍ په ځای).
- ستړیا
- سردرد
- تبه

دا غیرګونونه ښي چې ستاسو بدن د ناروغۍ پر وړاندې معافیت جوړوي. دا جانبي عوارض معمولاً خفیف وي او یوازې د څو ورځو لپاره دوام کوي. ممکن ځینې خلک په ډېر ندرت سره د واکسینو له تطبیق وروسته ځینې شدید حساسیتونه پیدا کړي. د دې له کبله، ځانګړي روزل شوي او څارل شوي روغتیايي کارمندان د واکسینو کولو پرمهال موجود وي.

